

Notice méthodologique

TITRE DE LA FICHE D'INDICATEURS

Bilan d'azote en agriculture et flux d'azote des sols vers les eaux

CATÉGORIE PRINCIPALE

Composantes environnementales et liens environnement-santé

THÉMATIQUE PRINCIPALE

Sols

CATÉGORIE SECONDAIRE

Activités humaines

THÉMATIQUE SECONDAIRE

Agriculture

SECTION 1 : AUTEUR

Nom	MAES
Prénom	Emmanuel
E-mail	emmanuel.maes@spw.wallonie.be
Tél	081/33.60.28

SECTION 2 : CONTEXTUALISATION DE LA FICHE D'INDICATEURS

Titre	Bilan d'azote en agriculture et flux d'azote des sols vers les eaux
Définition(s) de la fiche d'indicateurs	<p>La fiche traite des pressions exercées sur les ressources en eaux de surface et souterraines par les apports d'azote aux sols agricoles.</p> <p>Les indicateurs présentés sont les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bilan d'azote des sols agricoles en Wallonie (évolution sur la période 1971 - 2018)2) Flux d'azote des sols agricoles vers les eaux de surface et les eaux souterraines en Wallonie (évolution sur la période 1971 - 2018)3) Concentration en nitrate dans les eaux de percolation en Wallonie (carte) (moyenne 2014 - 2018)4) Azote potentiellement lessivable (APL) contrôlé en zones vulnérables en Wallonie. Valeurs moyennes par classe de culture (période 2008 - 2018) <p>Les indicateurs 1 à 3 permettent de suivre l'ampleur des flux d'azote depuis les sols agricoles vers les eaux de surface et souterraines. L'indicateur 4 permet de mettre en évidence certains facteurs qui influencent ces flux.</p>
Référence(s) (définition)	<p>La lutte contre la pollution des eaux par l'azote d'origine agricole fait l'objet des législations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">- Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj

	<p>- Programme de gestion durable de l'azote en agriculture (PGDA) faisant l'objet de l'AGW du 13/06/2014 modifiant le Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote en agriculture, https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=28717</p> <p>La mise en œuvre de ces législations en Wallonie est traitée plus en détail dans la fiche d'indicateur "Programme de gestion durable de l'azote en agriculture" (http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicator sheets/AGRI%209.html). Ces législations sont une réponse au problème de pollution diffuse dont il est question ici. Elles forment donc le cadre dans lequel cette thématique est gérée.</p> <p>Définitions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azote potentiellement lessivable (APL) : "la quantité d'azote nitrique contenue dans le sol à l'automne, susceptible d'être entraînée hors de la zone racinaire pendant l'hiver." (AGW du 13/06/2014, déjà cité) - Flux hypodermiques : écoulements dans les horizons superficiels du sol - Lixiviation : entraînement sous forme dissoute par les eaux de percolation vers les horizons de sol plus profonds
<p>Raison d'être de la fiche d'indicateurs</p>	<p>Les apports d'azote aux sols favorisent la production végétale et améliorent la qualité des cultures. Ces apports peuvent se faire sous différentes formes (minérales, organiques) qui diffèrent notamment par la disponibilité de l'azote pour les végétaux et, dans le même temps, par sa mobilité dans le sol.</p> <p>L'azote sous forme de nitrate (NO_3^-), très mobile, est entraîné par la pluie vers les masses d'eau de surface et souterraines lorsqu'il est présent en quantités excédentaires par rapport à la capacité de prélèvement des plantes. Il risque alors de dégrader leur qualité (eutrophisation des eaux de surface, dépassement de la norme de potabilité de 50 mg/l pour le nitrate dans les eaux souterraines).</p> <p>Selon la nature des apports, le nitrate est présent dans le sol directement (engrais azotés sous forme nitrique) ou après un certain délai nécessaire à sa formation par nitrification (engrais azotés sous forme ammoniacale) ou par minéralisation et nitrification (engrais azotés sous forme organique).</p> <p>Certains indicateurs permettent de simuler (modélisation EPICgrid) et de mesurer (mesures de l'APL dans les sols situés en zones vulnérables conformément aux exigences du PGDA) l'importance des flux d'azote depuis les sols agricoles vers les eaux de surface et souterraines (état) ainsi que leur évolution dans le temps (tendance).</p> <p>Les enjeux en termes de qualité des ressources en eau et le cadre législatif organisant la lutte contre ce phénomène de pollution diffuse justifient un suivi de ces indicateurs dans les rapports sur l'état de l'environnement wallon.</p>

SECTION 3 : MÉTHODOLOGIE

INDICATEUR 1

Titre	Bilan d'azote des sols agricoles en Wallonie
Description des paramètres présentés	<p>Le bilan d'azote (N) en agriculture vise à estimer pour les sols agricoles les entrées et les sorties cumulées de N. L'importance relative des différents éléments de ce bilan est modélisée à l'échelle de la Wallonie à l'aide du modèle EPICgrid, modèle hydrologique de bassin versant intégrant de nombreux paramètres (précipitations, températures, types et occupations des sols, croissance végétale, pratiques agricoles...) (Sohier, 2011).</p> <p>Sohier C. 2011. Développement d'un modèle hydrologique sol et zone vadose afin d'évaluer l'impact des pollutions diffuses et des mesures d'atténuation sur la qualité des eaux en Région wallonne (thèse de doctorat, Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech, Gembloux, Belgique). [http://hdl.handle.net/2268/86912].</p> <p>En entrée, les apports de N proviennent :</p> <ul style="list-style-type: none">• des engrais organiques ;• des engrais minéraux ;• des dépôts atmosphériques ;• de la fixation symbiotique (légumineuses). <p>En sortie, les retraits de N sont imputables :</p> <ul style="list-style-type: none">• aux exportations par les cultures ;• aux pertes par volatilisation ;• aux pertes par ruissellement et par flux hypodermiques lents vers les eaux de surface ;• aux pertes par lixiviation vers les eaux souterraines ;• aux pertes par érosion vers les eaux de surface. <p>Les résultats des simulations sont moyennés sur 5 ans. La dernière mise à jour, effectuée en 2019, est une moyenne sur trois ans (2016 - 2018).</p>
Unité(s)	/ (Bilan en base 100, entrées pour la période 1971 - 1975 = 100)

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES

Output du modèle EPICgrid

Fournisseur des données	ULiège - Gembloux Agro-bio Tech
Description des données	Pour chaque année, estimation par le modèle EPICgrid des quantités, en kt de N, attribuables aux différents postes du bilan énumérés plus haut (entrées, sorties).
Traitement des données	<p>Une moyenne des valeurs annuelles est effectuée par période de 5 ans.</p> <p>Les données sont présentées en base 100, en prenant comme base 100 les entrées pour la période 1971 - 1975.</p> <p>Pour certaines raisons exposées à la Section 4, les données ne sont pas présentées en valeurs absolues (kt de N).</p>

INDICATEUR 2	
Titre	Flux d'azote des sols agricoles vers les eaux de surface et les eaux souterraines en Wallonie
Description des paramètres présentés	<p>Les flux d'azote (N) des sols agricoles vers les ressources en eau sont estimées à l'aide du modèle EPICgrid (voir indicateur 1).</p> <p>Deux types de flux sont simulés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vers les eaux de surface (par ruissellement et flux hypodermiques lents) - vers les eaux souterraines (par lixiviation) <p>Les résultats des simulations sont moyennés sur 5 ans. La dernière mise à jour, effectuée en 2019, est une moyenne sur trois ans (2016 - 2018).</p>
Unité(s)	Tonnes de N/an
DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES	
Output du modèle EPICgrid	
Fournisseur des données	ULiège - Gembloux Agro-bio Tech
Description des données	Estimation par le modèle EPICgrid des flux de N vers les eaux de surface et souterraines, en t de N/an.
Traitement des données	Une moyenne des valeurs annuelles est effectuée par période de 5 ans.
INDICATEUR 3 (CARTE)	
Titre	Concentration en nitrate dans les eaux de percolation en Wallonie
Description des paramètres présentés	<p>Carte des concentrations moyennes en nitrate à la base de la zone racinaire, simulées à l'aide du modèle EPICgrid (voir indicateur 1) et moyennées sur la période 2014 - 2018.</p> <p>Cinq classes de concentrations sont considérées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ≤ 10 mg NO₃⁻/l]10 - 25] mg NO₃⁻/l]25 - 40] mg NO₃⁻/l]40 - 50] mg NO₃⁻/l > 50 mg NO₃⁻/l <p>Les calculs sont effectués par maille de 1 km².</p> <p>La carte présente en hachurés les zones vulnérables telles que définies par le PGDA (voir références plus haut).</p> <p>Deux graphiques en secteurs présentent la distribution du territoire selon les classes de concentrations ci-dessus (i) pour l'ensemble de la Wallonie et (ii) pour la part du territoire wallon situé en zones vulnérables.</p>

Unité(s)	mg NO ₃ ⁻ /l																
DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES																	
Output du modèle EPICgrid																	
Fournisseur des données	ULiège - Gembloux Agro-bio Tech																
Description des données	Estimation par le modèle EPICgrid des concentrations annuelles en nitrate à la base de la zone racinaire, en mg NO ₃ ⁻ /l, pour chaque maille de 1 km ² .																
Traitement des données	Une moyenne des valeurs annuelles est effectuée pour la période de 5 ans qui précède la dernière mise à jour.																
INDICATEUR 4																	
Titre	Azote potentiellement lessivable (APL) contrôlé en zones vulnérables en Wallonie. Valeurs moyennes par classe de culture																
Description des paramètres présentés	<p>Au sein des zones vulnérables, des mesures de l'APL (kg N-NO₃⁻/ha présent dans le sol en fin de saison agricole, entre le 15/10 et le 30/11) sont réalisées chaque année dans 5 % des exploitations choisies aléatoirement (soit près de 700 exploitations) à des fins de contrôle de conformité (voir la fiche d'indicateurs "Programme de gestion durable de l'azote en agriculture", http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicator sheets/AGRI%209.html).</p> <p>Les prélèvements de sol et les analyses de l'APL sont effectués dans les 90 premiers cm du sol. Ils sont réalisés par des laboratoires agréés selon des méthodes standardisées.</p> <p>L'indicateur présente, pour les années 2008 à 2018, les valeurs moyennes d'APL pour les 8 classes de culture suivantes :</p> <table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>Betteraves</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>Céréales avec CIPAN*</td> </tr> <tr> <td>C3</td> <td>Céréales sans CIPAN*, chicorée</td> </tr> <tr> <td>C4</td> <td>Maïs</td> </tr> <tr> <td>C5</td> <td>Pomme de terre</td> </tr> <tr> <td>C6</td> <td>Colza</td> </tr> <tr> <td>C7</td> <td>Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits</td> </tr> <tr> <td>C8</td> <td>Prairies</td> </tr> </table> <p>Ces classes de culture sont celles pour lesquelles les limites de tolérance sont établies chaque année dans le cadre du contrôle de conformité des exploitations agricoles pour l'APL. Pour plus d'information à ce sujet, voir la fiche d'indicateurs "Programme de gestion durable de l'azote en agriculture", http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicator sheets/AGRI%209.html.</p> <p>*Cultures intermédiaires pièges à nitrate. Semée fin août (le 15/09 au plus tard), après la récolte principale, la CIPAN (moutarde, phacélie, avoine, ray-grass, seigle... en mélange ou non avec des légumineuses) permet d'absorber le nitrate présent dans le sol et d'éviter les pertes par lixiviation durant l'automne/hiver. Le nitrate et les autres éléments prélevés par la CIPAN, lentement restitués au sol après sa destruction (par le gel, par broyage, labour... à partir du 15/11), sont disponibles pour la culture semée au printemps.</p>	C1	Betteraves	C2	Céréales avec CIPAN*	C3	Céréales sans CIPAN*, chicorée	C4	Maïs	C5	Pomme de terre	C6	Colza	C7	Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits	C8	Prairies
C1	Betteraves																
C2	Céréales avec CIPAN*																
C3	Céréales sans CIPAN*, chicorée																
C4	Maïs																
C5	Pomme de terre																
C6	Colza																
C7	Légumes cultivés pour leurs feuilles, tiges ou fruits																
C8	Prairies																
Unité(s)	kg N-NO ₃ ⁻ /ha																

DONNÉES UTILISÉES POUR CONSTRUIRE LES PARAMÈTRES

Valeurs moyennes d'APL par type de culture

Fournisseur des données	SPW ARNE - Département de l'environnement et de l'eau
Description des données	Valeurs moyennes d'APL, par classe de culture (voir ci-dessus), pour l'ensemble de la Wallonie (2014 -2018)
Traitement des données	Reprise des données sans traitement

SECTION 4 : LIMITES DES INDICATEURS

Fiabilité et précision des données

Pour les indicateurs 1 à 3, les données présentées sont des *outputs* du modèle EPICgrid. Comme pour tout résultat de modèle, leur incertitude résulte de l'incertitude sur la structure du modèle, sur les variables d'entrée et sur les paramètres utilisés.

En ce qui concerne la structure du modèle, celui-ci reprend les équations de référence au niveau international. Les variables utilisées en *input* (variables climatiques, texture et teneur en carbone des sols, topographie, couverture végétale...) et les paramètres du modèle présentent une incertitude sur leur valeur et sur sa répartition spatiale. Les variables utilisées en *input* sont cependant connues avec une bonne précision en Wallonie.

Bilan d'azote en agriculture (indicateurs 1 et 2)

Pour certains postes du bilan, les résultats du modèle EPICgrid s'écartent des valeurs observées selon d'autres sources de données.

Ces écarts sont dus en particulier aux facteurs suivants :

- pour l'estimation du N organique

Les valeurs estimées par EPICgrid pour le poste "engrais organiques" diffèrent de celles de la fiche d'indicateurs "Consommation d'engrais en agriculture" (<http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%205.html>) en raison notamment d'une base différente pour le calcul de la superficie agricole utilisée (SAU) (COS 2007 pour EPICgrid contre SAU officielles/déclarées pour la fiche d'indicateur citée).

- pour l'estimation du N minéral

Les valeurs estimées par EPICgrid pour le poste "engrais minéraux" diffèrent de celles de la fiche d'indicateurs "Consommation d'engrais en agriculture" (<http://etat.environnement.wallonie.be/contents/indicatorsheets/AGRI%205.html>) en raison d'une désagrégation des quantités utilisées d'engrais par culture sur base de diverses hypothèses de calcul (cultures principales), désagrégation nécessaire pour que ces quantités puissent être utilisées en *input* dans le modèle EPICgrid.

	<p>Malgré ces différences, les contributions relatives des différents postes du bilan d'azote restent valables selon les auteurs du modèle. En conséquence, le bilan est présenté en valeurs relatives et non en valeurs absolues.</p> <p><u>Flux d'azote des sols agricoles vers les eaux (indicateur 3)</u></p> <p>À défaut de disposer de mesures de concentrations en nitrate dans les eaux de percolation spatialement distribuées, des essais de validation du modèle ont été effectués par Sohier (2011) (<i>op. cit.</i>) en comparant des concentrations en nitrate modélisées au voisinage de la nappe de base avec des mesures ponctuelles effectuées dans les eaux souterraines. Cette comparaison indique une concordance globale à l'échelle régionale, avec cependant des différences localement plus importantes. Pour une discussion plus détaillée des limites de cette comparaison et de ses résultats, voir Sohier (2011) (<i>op. cit.</i>).</p> <p><u>Azote potentiellement lessivable (APL) (indicateur 4)</u></p> <p>Une analyse approfondie de l'indicateur APL pour l'évaluation de la gestion du nitrate en agriculture et du risque pour la qualité de l'eau a été effectuée par Vandenberghe (2016).</p> <p>Vandenberghe, 2016. Performance de l'indicateur <i>Azote potentiellement lessivable</i> pour l'évaluation de la gestion du nitrate en agriculture et du risque pour la qualité de l'eau. Thèse de doctorat. Université de Liège - Gembloux agro-Bio Tech, Gembloux, Belgique. [→ https://orbi.uliege.be/handle/2268/201372]</p> <p>Pour le volet agronomique, au travers d'expérimentations ou du traitement de résultats de contrôles APL, il a été démontré que l'indicateur était bien corrélé aux pratiques de fertilisation ainsi qu'à la gestion de l'interculture. La performance de l'indicateur en tant qu'outil d'évaluation de la gestion de l'azote pratiquée par l'agriculteur a donc pu être validée. Quelques facteurs d'incertitudes (variabilité intraparcellaire, variabilité temporelle, densité apparente, charge caillouteuse) ont été quantifiés.</p> <p>Pour le volet environnemental, grâce à des observations réalisées pendant une dizaine d'années dans des parcelles équipées d'un lysimètre ou à l'échelle d'un petit bassin versant, la dépendance de la concentration en nitrate dans l'eau (base de la zone racinaire ou aquifère) à l'APL a pu être montrée, faisant de l'APL un indicateur valable pour le suivi de cette problématique.</p> <p>À ces éléments s'ajoutent les facteurs d'incertitudes liés à l'échantillonnage (choix des exploitations, choix des parcelles, constitution d'échantillons composites) et à l'analyse. Ces facteurs d'incertitude devraient être minimisés puisque l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par des laboratoires agréés, selon des méthodes standardisées. Une certaine marge d'incertitude sur la mesure est prise en compte dans l'établissement des limites de tolérance qui servent de référence pour juger de la conformité d'une parcelle donnée.</p>
Manque de données	/

SECTION 5 : ÉLABORATION DE L'ÉTAT ET DE LA TENDANCE

Paramètre évalué par le pictogramme	Flux d'azote des sols agricoles vers les eaux de surface et souterraines
ÉTAT	
Méthode d'attribution	/ (pas de référentiel)
Norme utilisée (si pertinent)	-
Référence(s) pour cette norme	-
TENDANCE	
Méthode d'attribution	Évaluation de la tendance en fonction de l'évolution des flux modélisés d'azote sur au moins 10 ans.
Norme utilisée (si pertinent)	-
Référence(s) pour cette norme	-

SECTION 6 : MISES À JOUR

Date de dernière mise à jour de cette fiche méthodologique	Décembre 2019
---	---------------